

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
Н.А. Власов

ИНСТРУКЦИЯ

по применению AD₃Евит раствора для перорального применения для профилактики и лечения гиповитаминозов AD₃Е и заболеваний, развивающихся на их фоне у животных, в том числе сельскохозяйственных птиц

(Организация-производитель ООО «Научно-производственная фирма «Вектор», г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: AD₃Евит раствор для перорального применения (AD₃Еvit solutio per usum oral)

Международное непатентованное наименование: ретинол ацетат + холекальциферол + альфатокоферола ацетат.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения. В качестве действующих веществ содержит в 1 см³:

- витамина А (ретинола ацетата) – 10000 МЕ, витамина D₃ (холекальциферола) – 15000МЕ, витамина Е (альфа-токоферола ацетата) – 10 мг, вспомогательного компонента масла рафинированного – до 1 см³.

3. Выпускают лекарственный препарат в полиэтиленовых, стеклянных, полимерных флаконах и полимерных канистрах.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 24 месяца со дня изготовления.

AD₃Евит раствор для перорального применения запрещается применять по истечении срока годности.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°С до 25 °С.

5. AD₃Евит раствор для перорального применения следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата не требуется.

II. Фармакологические свойства

7. AD₃Евит раствор для перорального применения – комплексный витаминный лекарственный препарат, в котором витамины А, D₃, Е находятся в физиологически обоснованных соотношениях.

Витамин А – регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальной ткани, тем самым повышает сопротивляемость инфекции.

Витамин Д₃ – регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, что предупреждает развитие рахита.

Витамин Е – регулирует окислительно-восстановительные процессы, влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и Д₃.

AD₃Евит по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. AD₃Евит раствор для перорального применения применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, ксерофтальмии, рахита, остеомалации, тетании, энцефаломалации, токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых оболочек у млекопитающих и птиц, а также для повышения плодовитости животных и жизнеспособности молодняка.

9. Противопоказаний для применения лекарственного средства не установлено. Одновременно с назначением AD₃Евит раствора для перорального применения необходимо балансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

10. Лекарственный препарат вводят животным перорально индивидуальным путем или групповым способом, в смеси с кормами в кормоцехах, в профилактических целях ежедневно в течение 2-3 месяцев в дозах:

При индивидуальном применении

Вид животных	На животное	
	капли	мл
Крупный рогатый скот, лошади	10	0,2
Телята, жеребята	6	0,1
Овцы, козы	5	0,1
Ягнята	1	0,02
Свиньи	5	0,1
Поросята, подсвинки	3	0,06
Собаки	2-4	0,04
Кошки	1-2	0,03
Песцы и лисы	2	0,04
Кролики	2	0,04
Норки	1	0,02

Гуси	2	0,04
Индейки	2	0,04
Индюшата	3	0,06
Куры	1-2	0,02
Утки	1-2	0,02

При групповом применении в смеси с кормом

	мл/т корма
Свиноматки	450
Супоросные	200-450
Ремонтный молодняк свиней	200
Поросята-отъемыши	300
Куры	800
Индейки	800
Индюшата	1200
Утки	1000
Гуси	800

С лечебной целью препарат применяют по назначению ветеринарного врача в дозах в три раза выше профилактических.

11. Симптомы передозировки не выявлены.

12. При появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства.

13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы, так как это может привести к снижению терапевтического эффекта. При пропуске введения очередной дозы необходимо ввести ее как можно скорее.

14. Побочных явлений и осложнений при применении AD₃Евит раствора для перорального применения в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается.

15. AD₃Евит раствор для перорального применения совместим со всеми ингредиентами кормов, кормовыми добавками и другими лекарственными препаратами.

16. Продукцию от животных после применения AD₃Евит раствора для перорального применения можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с AD₃Евит раствором для перорального применения следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами.

18. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей.

19. Организация-производитель: ООО «НПФ «Вектор», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, 10, к.3, лит. А., пом. 11-н.

Инструкция разработана ООО «Научно-производственная фирма «Вектор», г. Санкт-Петербург.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер 78-3-8.0-0300 НПФВР-3-8.0/02654